



Rosa Indica vulgaris.

P.J. Redouté pinx.

Rosier des Indes commun.

Superficie de Rouen.

Boissier sculp.

LES ROSES.

51

ROSA INDICA VULGARIS.

R. germinibus ovatis pedunculisque glanduloso-hispidis; caule petiolisque aculeatis; floribus subpaniculatis. Semperflorens. (N.)

R. (Semperflorens), caule aculeato foliis subternis pedunculisque subnullifloris, aculeatis, hispidis, calycis foliolis subintegris. CURTIS. mag. 284.

R. Indica. ANDREWS, ROSES.

R. Semperflorens. NOUV. DUHAM. 7, p. 24, VII. 11.

LE ROSIER DES INDES, COMMUN.

(Vulg. le Rosier du Bengale.)

DESCRIPTION.

On distingue cette variété à ses tiges vertes et lisses, qui partent de la base, et s'élèvent à quatre ou six pieds. Elles sont armées d'aiguillons forts, recourbés et rougeâtres. Les feuilles de trois ou cinq folioles vertes, luisantes, glabres, simplement dentées, sont portées par des pétioles ciliés et munis de petits aiguillons crochus. Les fleurs semi-doubles, d'un rose tendre, naissent quelquefois solitaires, mais plus souvent plusieurs ensemble à l'extrémité des rameaux, et forment, par leur réunion, une espèce de panicule. Les tubes ovales du calice, à divisions presque toujours munies de quelques pinnules, sont légèrement hispides, ainsi que les pédoncules qui les supportent.